

각종 스트레스시 해열진통

카스피린-C



1kg

■원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)

- 아스피린(Acetylsalicylic acid, KP) ----- 300g
- 비타민C (Vitamin C, KP) ----- 33.3g

■효능 및 효과

- 닭, 돼지, 송아지의 해열 및 진통

■용법 및 용량

- 체중 kg당 1일 본제 0.1~0.133g을 2~3일간 경구 투여
- 1. 닭 : 음수 1L당 본제 1g을 용해하여 경구투여
- 2. 돼지
 - 체중 50kg 미만 : 1일 본제 1~6g을 경구투여
 - 체중 50~150kg : 1일 본제 6~16g을 경구투여
 - 체중 150kg 이상 : 1일 본제 16~160g을 경구투여
- 3. 송아지
 - 체중 50kg 미만 : 1일 본제 1~6g을 경구투여
 - 체중 50~150kg : 1일 본제 6~16g을 경구투여
- 4. 사료첨가 투여시 : 사료톤당 본제 2kg을 혼합하여 투여

■저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 직사광선을 피하고 실온에 보관
- 유효기간 : 제조일로 부터 2년

■주의사항

- 과량 투여시 구토, 설사 등 소화기 장애를 유발할 수 있으며 소화기 장애유발시는 투약을 중지하십시오.
- 투약기간을 준수하십시오.
- 사용 후 잔량을 밀봉하여 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 흡입이나 눈, 피부에 접촉시 위장장애, 구토, 설사, 피부자극, 화상 등의 부작용이 일어날 수 있으니 사용시 보호장비를 착용하십시오. 흡입이나 눈에 접촉하여 부작용이 발생시 의사의 처치를 따르십시오.



OTHER
4100001



충남 예산군 신암면 추사로 235-9 영업부:(031)478-5560(대표)

