

수산용 카목신 주

■ 원료 약품 및 분량 (본제 1g 중)

- 아목시실린 나트륨 (Amoxicillin sodium, BP) ----- 1,000mg(역가)

■ 효능 및 효과

- 아목시실린에 감수성이 있는 아래 세균성 질병 예방 및 치료
가. 대상어종 : 넙치(Olive flounder)
나. 세균성질병 : 연쇄구균증 (*Streptococcus iniae*, *S. parauberis*)

■ 용법 및 용량

- 본제 1g 당 주사용수 10mL의 비율로 희석하여 다음의 용량을 1일 1회 등근육 주사
가. 넙치 : 어체중 kg 당 본제 0.4mL(아목시실린으로서 40mg)

■ 저장방법 및 유효기간

- 실온(1~30℃)에서 건조하고 차광된 장소에 보관, 기밀용기
- 제조일로부터 24개월

■ 포장단위

- 10g, 20g, 50g, 100g

■ 주의사항

가. 사용방법상의 주의사항

- 지정된 어종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 15cm 이상의 넙치에서만 사용하고 반드시 등근육으로 주사하십시오.
- 사용설명(주의사항)을 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 개봉한 제품은 가급적 빨리 사용하십시오.
- 근육주사 부위에 국소반응이 일어날 수 있으나 일시적이며 경미합니다.
- 용법·용량을 준수하고 투여기간 동안 동일성분의 다른 약제를 투여하지 마십시오.
- 한 부위에 수회 주사하지 마십시오.
- 스킨카츨 등 기생충에 감염되었을 경우에는 접종부위에 감염이 우려되므로 사용을 자제하여 주시기 바랍니다.
- 접종 시 충분한 산소공급 등 접종할 어군이 최대한 스트레스를 받지 않도록 하십시오.
- 접종 후 약 10일 동안은 채포, 이동 및 청소 등은 가능한 피하십시오.

나. 휴약기간

- 넙치: 20일

다. 저장상의 주의사항

- 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.
- 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기 처리하십시오.
- 오용 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 용기나 포장지 이외의 다른 용기에 소분하여 보관하지 마십시오.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

라. 기타 주의사항

- 수산질병관리사 및 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 초남용에 의한 약화사고 및 수산식품에 잔류 등 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
- 취급 시 먼지가 나지 않도록 주의하고 작업장소는 충분히 환기시켜 주십시오.
- 타 동물용의약품과 병용 투약 시는 반드시 수산질병관리사 또는 수의사와 상의 하십시오.

KBNP 고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9
영업부:(031)478-5560(대표)
www.kbnp.co.kr

4340055
131220

