

메타플루300주



■원료 약품 및 분량 (본제 1mL 중)

- 플로르페니콜 (별규 1) ----- 300mg
- 프로필렌글리콜 (KVP) ----- 적 량
- 폴리에틸렌글리콜 400(KVP) ----- 적 량
- N-메틸-2-피롤리돈 (별규 2) ----- 적 량

■효능 및 효과

- 소 : 파스튜렐라 페렴(*P.heaemolytica*, *P. multocida*), 헤모필루스성 폐렴(*H.somnus*)균에 의한 소세균성 호흡기 질병(BRD) 치료
- 돼지 : 마이코플라즈마성 호흡기질병(*M.hyoepuemoniae*, *M.hyorhinis*), 흉막폐렴(*A.pleuropneumoniae*) 등의 감염증에 대한 치료

■용법 및 용량

- 소 : 체중 15kg당 본제 1mL를 목 부위에 근육 주사, 48시간 후 같은 양을 추가 주사한다.
- 돼지 : 체중 10kg당 본제 0.5mL를 목 부위에 근육 주사, 48시간 후 같은 양을 추가 주사한다.

■저장방법 및 유효기간

- 실온(1~25°C)에 직사광선을 피하여 보관(밀봉용기)
- 제조일로부터 24개월



동물용의약품
휴약기간준수

메타플루300주

광범위 합성 항균제

100 mL



■주의사항

- 가. 부작용
- 1) 주사 후 돼지의 항문주위에 부종과 홍반이 일시적으로 생길 수 있습니다.
 - 2) 투여 후 일시적인 사료와 물의 섭취 감소나 설사가 일어날 수 있습니다.
- 나. 일반적 주의사항
- 1) 지정된 가축에만 사용하십시오.
 - 2) 정해진 용법, 용량을 반드시 준수하십시오.
 - 3) 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하십시오.
 - 4) 다른 약제와 병용하지 마십시오.
 - 5) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 다. 임신, 수유축에 대한 투여
- 생식과 임신 및 착유에 대한 평가가 이루어지지 않았으므로 중부 일령이나 임신 중인 동물과 착유중인 동물에는 사용하지 마십시오.
- 라. 적용상의 주의사항
- 근육주사로 인하여 부분적인 조직 손상이 일어날 수 있으므로 한 주사부위에 10mL 이상 주사하지 마시고, 반드시 목 부위에 근육주사 하십시오.
- 마. 휴약기간
- 1) 소 - 28일, 돼지 - 14일
 - 2) 오남용 시 식육 등 축산식품에 잔류할 수 있습니다.
- 바. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
 - 2) 운송, 저장시 제품의 이상이나 변질이 있을 때에는 구입처에서 즉시 교환하십시오.
- 사. 기타 주의사항
- 1) 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
 - 2) 동물용의약품이므로 사람에게에는 절대 사용하지 마십시오.
 - 3) 기타 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.



충남 예산군 신암면 추사로 235-9
 영업부: (031)478-5560(대표)