



힘백 돈사방 TPR 혼합생백신

본 백신은 농림축산검역본부로부터 분양받은 돼지 전염성위장염 바이러스(175L), 유행성설사병 바이러스(SM98P), 로타바이러스(A1, 10)주를 이용한 TGE, PED, Rota 예방 백신입니다.

■ 원료 약품 및 분량 (1두분증)

- TGE 바이러스(175L) $10^{7.0}$ TCID₅₀ 이상 --- 25%
- PED 바이러스(SM98P) $10^{7.0}$ TCID₅₀ 이상 --- 25%
- Rota 바이러스(A1) $10^{8.0}$ TCID₅₀ 이상 ----- 15%
- Rota 바이러스(10) $10^{8.0}$ TCID₅₀ 이상 ----- 15%
- 보호제(TPGG) ----- 20%

■ 세형 및 성상

- 미색 또는 유백색의 건조고로서 용해용 용액을 가하여 흔들면 쉽게 혼탁액이 되며 굵은 입자나 이물, 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이 균일합니다.

■ 효능 및 효과

- 돼지 설사예방 백신으로 전염성위장염, 유행성설사, 로타 바이러스에 의한 설사병을 동시에 예방할 목적으로 사용합니다.

■ 용법 및 용량

- 접종방법 : 동봉된 희석액으로 용해하여, 두당 2mL 를 근육주사 합니다.
- 접종시기 : 임신돈 분만 5~6주 전 1차 접종, 분만 2~3주 전 2차 2mL씩 근육주사 합니다.

■ 저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 2~8°C의 냉암실에서 동결되지 않도록 보관하고, 일광에 노출시키지 마십시오.
- 유효기간 : 제조일로부터 18개월 유효합니다.

■ 포장 단위

- 5두분, 10두분, 20두분

■ 주의사항

가. 휴약기간 : 없음

나. 부작용

접종 후 개체에 따라서 과민반응이 나타날 수 있으며, 이런 경우 마사지, 에피네프린 투여가 권장되므로 수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.

다. 금기사항

- 다음 돼지에는 접종하지 마십시오.
- 1. 열이 있거나 영양장애가 심한 돼지
- 2. 전염병 감염 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 돼지
- 3. 공팡이 및 세균독소에 의해 면역기능이 저하된 돼지
- 4. 이전에 본 백신에 과민반응이나 쇼크를 일으킨 경험이 있는 돼지

라. 사용법상의 주의사항

- 1. 반드시 건강한 돼지에만 접종하십시오.
- 2. 사용 전에 사용설명서를 충분히 숙지하시고 사용하십시오.
- 3. 멀균 1회용 주사기를 사용하고 1두 1침을 원칙으로 하십시오.
- 4. 다른 백신 혹은 약제와 혼합하는 경우 침전 및 이물형성이 나타날 수 있으므로 절대 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 5. 백신은 직사광선을 피하며, 용해 후 즉시 사용하십시오.
- 6. 백신용해 시에는 충분히 흔들어서 완전히 용해한 후 사용하십시오.
- 7. 접종부위는 알코올 솔브로 소독건조 후 주사하십시오.
- 8. 백신 접종 2주간은 스트레스를 피하고, 아외 바이러스 노출에 주의 하십시오.
- 9. 사용 후 남은 백신과 빈 용기는 소독 또는 소각하여 안전하게 폐기 하십시오.

마. 기타 주의사항

- 1. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 2. 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

