

바로킬-P

VAROKIL-P

【개 요】

바로킬-P는 염산시미아졸을 주성분으로 하는 제품으로 꿀벌 응애에 대한 우수한 구제효과와 높은 안전성이 입증되어 세계적으로 널리 사용되고 있으며, 그동안 수입품에만 의존하던 것을 한국과학기술원(KIST)과 공동 개발하여 국내 독점 생산 판매하는 꿀벌 응애 전문 구제제입니다.

【성분 및 함량】 본제 1kg중

· Cymiazole hydrochloride(별규 1, Cymiazole로사) 175g
· 백당 적량

【성 상】

· 백색 내지 담갈색의 분말

【효능 및 효과】

· 꿀벌진드기(Varroa jacobsoni Oudemans)의 진단 및 구제

【용법 및 용량】

1) 뿌려주기법

· 본제 40g을 2L(1도) 설탕용액에 녹여 분공에 뿌려주십시오.

소 비 대 수	용 액 소 요 량	처 리 분 공 수
2 ~ 4매	25ml	80군
5 ~ 7매	50ml	40군
8 ~ 10매	75ml	27군
11 ~ 14매	100ml	20군

· 치료목적으로는 1주간격으로 2회 투여하고, 진단목적으로는 1회만 투여하십시오.

· 50ml 주사기를 이용하여 모든 소비마다 벌에 뿌려주며, 진단시에는 벌통일에 밝은 빛깔의 판지를 깔고 투여 2~3일 후 진드기를 확인하십시오.

· 투여 후 약 8시간 동안은 외부 온도 10°C 이상으로 유지되어야 합니다.

2) 사양액 혼합 급이법

· 본제 80g을 따뜻한 물에 완전히 용해한 후 설탕용액(설탕물) 20L(한말)에 넣어 사양수와 잘 혼합하여 다음과 같이 사양 급이 하십시오.

소 비 대 수	용 액 소 요 량	처 리 분 공 수
2 ~ 4매	0.25L	80군
5 ~ 7매	0.5L	40군
8 ~ 10매	0.75L	27군
11 ~ 14매	1L	20군

※ 위 표를 참조하여 일상적인 사료 급이 방법으로 급이하십시오.

3) 화분 혼합 급이법

· 본제 80g을 따뜻한 물 약 8-10L에 완전히 용해한 후, 분쇄한 화분 40kg과 설탕 30kg을 혼합·반죽하여 다음과 같이 사양 급이 하십시오.

소 비 대 수	반 죽 화 분 량	처 리 분 공 수
2 ~ 4매	1kg	80군
5 ~ 7매	2kg	40군
8 ~ 10매	3kg	27군
11 ~ 14매	4kg	20군

※ 월동후 화분급여시 본제를 투여하되 1회에 한합니다.

【저장방법 및 유효기간】

· 저장방법 : 냉암소(25°C 이하)에 보관하십시오.

· 유효기간 : 제조일로부터 36개월

【주의사항】

1) 부작용

- 약물이 혼합된 사양수를 섭취한 꿀벌은 약간의 소동이 발생할 수 있습니다.

- 봄, 가을철 약품처리 후에 진드기, 타일병에 감염된 꿀벌이나 노봉이 기어 나오는 현상이 나타나기도 합니다.

2) 급기사항

- 유밀기, 채밀기 직전에는 사용하지 마십시오.

- 금속 사양기를 사용하지 마십시오.

- 유효성이 많은 육아시기에는 약품을 처리하지 마십시오.

3) 사용상 주의사항

- 용량·용법을 꼭 지켜 사용하십시오.

- 뿌려주기 방법은 처리 후 약 8시간 동안 외부기온이 10°C 이상 되는 시기에 사용하십시오.

- 꿀벌진드기 진단 및 구제에만 사용하십시오.

- 봄, 가을 처리시에는 충분한 사양급이 후 약품을 사용하십시오.

- 가을철 약품처리는 월동사양을 마친 후 사용하십시오.

- 설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

4) 기타 주의사항

- 어린이, 노약자 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

【포 장】

· 40g, 80g

※ 자세한 제품문의는 02)923-3470으로 연락주시기 바랍니다.