

음수소독 · 발포성 소독제

라이프가드정

100정



동물용의약품

■ 원료약품 및 분량 [본제 1정(13g)당]

[유효성분] - 이염화이소시아눌산나트륨(Sodium dichloroisocyanurate, 별규) ----- 5g
(유효염소함유량으로서 23%)

[첨가제] - 탄산수소나트륨(Sodium bicarbonate, KVP) - 구연산(Citric acid, KVP)

■ 용법 및 용량 - 분무소독 : 아래 표의 비율로 희석하여 골고루 분무 소독하십시오.

권장희석배수

소독대상	대상질병명	일반세균				특정세균				특정바이러스						
		Salmonella choleraesuis	Brucella ovis	Streptococcus suis	Mycobacterium bovis (우결핵균)	구제역	돼지열병	돼지호흡기증후군	뉴캐슬	인제티아	조류뉴모	봉인체성	가염	아프리카 돼지열병		
유기물이 적은 소독대상	축사공간 및 축체표면, 기구 등	일반세균 + 특정 병원체	7,200배 (1정/물 93L 당)	3,500배 (1정/물 45L 당)	8,000배 (1정/물 104L 당)	1,600배 (1정/물 20L 당)	190배 (1정/물 2.5L 당)	12,000배 (1정/물 156L 당)	12,500배 (1정/물 162L 당)	9,000배 (1정/물 117L 당)	6,400배 (1정/물 83L 당)	700배 (1정/물 9L 당)	500배 (1정/물 6.5L 당)	500배 (1정/물 6.5L 당)		
유기물이 많은 소독대상	축사바닥, 오물 사체, 농장차량 운반용구 등	일반세균 + 특정 병원체	540배 (1정/물 7L 당)	400배 (1정/물 5L 당)	720배 (1정/물 9.3L 당)	200배 (1정/물 2.6L 당)	1,000배 (1정/물 13L 당)	750배 (1정/물 9.7L 당)	1,000배 (1정/물 13L 당)	320배 (1정/물 4.2L 당)	50배 (1정/물 650mL 당)	100배 (1정/물 1.3L 당)	100배 (1정/물 1.3L 당)	500배 (1정/물 6.5L 당)		

-음수소독 : 물 500~1000L당 본제 1정을 용해하여 투여 하십시오.

- 1) 음수를 통하여 생독백신을 사용시 투여 당일과 전후 2일씩 총 5일간 음수 소독을 하지 마십시오.
- 2) 산란계(식용 목적의 알을 생산하고 있는 닭)의 음수 소독에는 사용하지 마십시오.
- 3) 음수소독 후 아래의 기간은 식용으로 제공 할 목적으로 출하하지 마십시오
돼지, 닭 : 1일

5201067/21 1215



용동 : HDPE
뚜껑 : PP

라이프가드정

음수소독 · 발포성 소독제

100정



■ 효능 및 효과

- 축사소독, 축체소독, 축사설비소독, 음수소독
- 일반세균(Salmonella choleraesuis), 부루셀라, 연쇄상구균, 우결핵균(Mycobacterium bovis) 등의 살균 소독
- 바이러스 : 구제역 바이러스(FMD virus), 뉴캐슬병바이러스(ND virus), 돼지열병바이러스(Classical Swine Fever virus), 돼지생식기호흡기증후군바이러스(PRRS virus), 조류인플루엔자바이러스(AI virus), 조류뉴모바이러스(APV), 봉인체성간염바이러스(IBH virus), 아프리카 돼지열병바이러스(ASF virus)의 살멸 및 소독

■ 저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 실온(1~25℃)의 건조하고 그늘진 곳에 보관하십시오.
- 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■ 주의사항

가. 급기사항

- 1) 강산(pH3이하), 강알칼리(pH10이상), 타염소제, 유지류, 기타 화합물질 및 가연성 물질과의 직접적인 접촉을 피하여 주십시오.

나. 적용상의 주의사항

[제품 사용시 주의사항]

- 1) 소독제를 희석하는 경우에는 가급적 당일에 사용하십시오.
- 2) 유기물질(가축의 배설물, 혈액, 우유 등)이 있는 경우 소독효과가 떨어질 수 있으므로 소독액에 혼합되지 않도록 하고, 소독작업은 최대한 청소, 세척후 실시하십시오.
- 3) 축사공간 분무 소독 시에는 반드시 빈축사에 사용하고 권장희석배수를 준수하여 실시하십시오.
- 4) 음수소독 시 규정농도가 넘으면 음수량이 감소하므로 희석배수를 정확히 지켜 사용 하십시오.

[취급자에 대한 주의사항]

- 1) 소독액 살포 또는 분무 시에는 반드시 호흡보호구(방진 또는 방독마스크 등), 보호안경, 보호장갑, 보호복 등 개인보호장구를 착용하여 흡입되거나 눈이나 피부에 노출되지 않도록 주의하십시오.
- 2) 밀폐된 장소에서 사용하지 말고 환기에 의하여 작업하고 장시간(2시간 이상)에 걸쳐 연속작업을 피하십시오.
- 3) 소독작업 후에는 반드시 비누와 물로 손과 몸을 씻고, 충분히 양치하십시오.

[자연환경에 대한 주의사항]

- 1) 소독제 또는 소독액이 각종 수원(식수원, 농업용수원 등), 양어장, 양식장, 하천, 전담 등으로 직접 유입되지 않도록 하십시오.
- 2) 소독액 사용 후 남겨진 잔액은 지방자치단체 조례에 따라

처리하십시오.(회수폐기 하거나 반드시 충분히 희석(1,000배 이상) 또는 중화하여 방출하시기 바랍니다.)

- 3) 소독액이 활성오니법에 의한 폐수처리시설에 직접 유입되지 않도록 하십시오.

다. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이와 동물의 접근이 불가능한 그늘진 곳에 보관하십시오.
- 2) 개봉 후 가급적 빨리 사용하고, 남은 것은 밀폐하여 본제의 저장방법에 따라 보관하십시오.
- 3) 다 쓴 용기 또는 포장지는 환경에 노출되지 않도록 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 4) 금속용기에는 소독액을 2시간 이상 넣어두지 마십시오.

라. 상호작용

- 1) 약효 및 안전성에 문제가 발생할 수 있으므로 다른 제품과는 절대 혼합하여 사용하지 말고 다른 제품이 혼합되지 않도록 주의하십시오.

마. 일반적 주의사항(응급조치)

- 1) 소독제 및 소독액이 피부, 눈, 음식물, 식품 및 어린이 장난감 등에 직접 닿지 않도록 하십시오.
- 2) 피부나 눈에 묻었을 경우 즉시 흐르는 물로 충분히 씻어내고 이상증상이 있을 경우 의료기관을 방문하여 의사의 처치를 받으십시오.
- 3) 흡입하거나 삼켰을 경우 즉시 응급조치를 취하고 의료기관을 방문하여 의사의 처치를 받으십시오.
- 4) 과민증 등으로 이상반응이 있을 때 즉시 제품의 취급을 중단하십시오.

바. 기타 주의사항

- 1) 사용설명서의 주의사항에 따라 사용하십시오.
- 2) 수의사의 지시에 따라 사용하고, 사용내역을 기록하십시오.



충남 예산군 신암면 추사로 235-9
영업부:(031)478-5560(대표)