

힘백 돈호방 – PAR (Himmvac Donoban-PAR vaccine)

A. pleuropneumoniae serotype 2&5, *P. multocida* type A, D and B, *bronchiseptica* Bacterin

본 백신은 국내에서 다발하는 돼지 호흡기 질병인 흉막폐렴 2형/5형, 파스튜렐라 폐렴 A형/D형 및 보데텔라형원을 함유하여 육성·비육돈의 주요 호흡기 질병을 예방하기 위한 불활화 혼합백신입니다.

【성분 및 함량】

<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> S-2 사균액	... 16.1%
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> S-5 사균액	... 16.1%
<i>Pasteurella multocida</i> type A 사균액 16.1%
<i>Pasteurella multocida</i> type D 사균액 16.1%
<i>Bordetella bronchiseptica</i> (P-4) 사균액 16.1%
수산화알미늄 젤 16.2%
Formalin 0.3%

【성 성】

유백색 내지 황갈색의 흔탁한 부유액이며, 정치하면 백신 내용물의 침전이 생기나 흔들면 쉽게 균질한 흔탁액이 됩니다.

【효능 및 효과】

이 백신은 돼지의 흉막폐렴 (2형&5형), 파스튜렐라 폐렴 (A형&D형) 및 위축성비염(보데텔라균)을 예방할 목적으로 사용합니다.

【용법 및 용량】

- 지 돈 : 생후 3주령에 1ml, 5주령에 2ml 씩 근육내에 접종하고, 그 후는 성돈 및 임신모돈의 접종방법에 따릅니다.
- 성 돈 : 1회 2ml 씩, 2~3개월 간격으로 2회 근육내에 접종합니다.
- 임신 돈 : 분만전 30일 및 15일에 각각 2ml 씩 2회 근육내에 접종하고, 그 후 보강접종은 분만 30일전에 2ml 씩 1회 근육내에 접종합니다.

【저장방법 및 유효기간】

(저장방법) 2~8°C 냉장고에 보관하십시오.
(유효기간) 제조일로부터 24개월간 유효합니다

【주의사항】

- 돼지의 건강상태를 확인한 다음 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 본 백신은 실온으로 던힐 후 충분히 훈들어서 사용해야 합니다.
- 본 백신은 건강한 돼지에게만 사용하십시오.
- 본 백신은 고온이나 햇빛에 노출시키지 않도록 하며 일단 동결된 백신은 사용하지 마십시오.
- 일단 개봉한 백신은 전량 사용하도록 하며 사용후 남은 백신이나 백신병은 소각처분 하십시오.
- 쇼크가 나타날 경우에는 에피네프린(Epinephrine)을 투여 하십시오. 백신을 차기운 채로 접종하거나 권장시기보다 어린 일령에 과량을 접종했을 경우에는 쇼크가 일어날 수도 있습니다.
- 백신접종 후에는 접종부위에 세균이 감염되지 않도록 돈사환경을 청결히 유지하십시오.
- 주사부위에 일시적인 국부종창이 일어날 수 있으나 수일내에 소실됩니다.
- 도살전 21일 이내에는 사용하지 마십시오.

【포장단위】

- 20ml, 50ml, 100ml