



# 우사방-로코 생독흔합백신

본 백신은 국내에서 송아지 설사를 유발하는 주요 원인체인 로타바이러스 및 코로나바이러스를 항원으로 함유하여 송아지 및 임신우 설사예방에 탁월한 효과를 보입니다.

## ■ 원료약품 및 분량 (1두분 중)

- 소로타바이러스(678주) -----  $10^{5.0}$ TCID<sub>50</sub> 이상
- 소로타바이러스(P44주) -----  $10^{5.0}$ TCID<sub>50</sub> 이상
- 소코로나바이러스(BC94주) --  $10^{4.0}$ TCID<sub>50</sub> 이상
- 보호제(LPGG) ----- 적량

## ■ 성상

- 미색 또는 유백색의 건조괴로서 희석액을 혼합하여 흔들면 쉽게 균질한 혼탁액이 되며 굵은 입자나 이물, 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이 균일합니다.

## ■ 효능 및 효과

- 송아지 설사를 일으키는 소 로타 바이러스, 소 코로나 바이러스 감염증의 동시 예방

## ■ 용법 및 용량

- 동봉된 희석액을 규정량 주입하여 희석한 후 아래와 같이 접종
  1. 임신우 : 분만 6주전, 분만 4주전에 2mL씩 근육 주사
  2. 송아지 : 초유 섭취전 4mL 경구투여

## ■ 저장방법 및 유효기간

- 2~8°C의 냉암소에 보관하십시오
- 제조일로부터 15개월간 유효합니다.

## ■ 주의사항

- 휴약기간 : 없음.

- 1) 접종 후 개체에 따라서 과민반응이 나타날 수 있으며, 이런 경우 맷사지, 에피네프린 투여가 권장되므로 수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 열이 있거나 영양장애가 심한 소, 전염병 감염 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 소, 곰팡이 및 세균 독소에 의해 면역기능이 저하된 소에는 접종하지 마십시오.
- 3) 반드시 건강한 소에만 접종하십시오.
- 4) 사용 전에 사용설명서를 충분히 숙지하시고 사용하십시오.

- 5) 멀균 1회용 주사기를 사용하고 1두 1침을 원칙으로 하십시오.
- 6) 다른 백신 혹은 약제와 혼합하는 경우 침전 및 이물형성이 나타날 수 있으므로 절대 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 7) 백신은 직사광선을 피하며, 용해 후 즉시 사용하십시오.
- 8) 접종부위는 알코올 솜으로 소독건조 후 주사하십시오.
- 9) 백신 접종 후 2주간은 스트레스를 피하고, 야외 바이러스 노출에 주의하십시오.
- 10) 사용 후 남은 백신과 빈 용기는 소독 또는 소각하여 안전하게 폐기하십시오.
- 11) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 12) 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

## ■ 포장단위

- 1두분, 2두분, 5두분, 10두분, 20두분

