

컴피실린 주

■ 원료약품 및 분량 (본제 1g 중)

- 암피실린나트륨(KVP) ----- 1,000mg(역가)

■ 효능 및 효과

- 암피실린에 감수성이 있는 다음의 세균성 질병의 예방 및 치료
가. 중·대동물(소, 돼지) : 폐렴, 기관지염, 세균성 설사증
나. 소동물(개, 고양이) : 폐렴, 기관지염, 세균성 설사증,
세균성 피부감염증

■ 용법 및 용량

- 본제 1g당 주사용수 10mL의 비율로 희석하여 다음의 용량을
1일 1~2회 근육 또는 정맥주사
- 가. 중·대동물(소, 돼지) : 1일 체중 100kg당 5~10mL
(암피실린으로서 500~1,000mg)
- 나. 소동물(개, 고양이) : 1일 체중 kg당 0.1~0.2mL
(암피실린으로서 10~20mg)

■ 저장방법 및 유효기간

- 실온(1~30°C)의 건암소 보관, 밀봉용기
- 제조일로부터 24개월

■ 주의 사항

- 가. 다음 환축에게는 투여하지 마십시오.
 본체 및 페니실린계 항생물질에 대한 쇼크와 과민반응이
 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- 나. 부작용
 - 1. 페니실린계 항생물질에 대해 과민한 동물에서는 드물게
 쇼크가 일어나는 수가 있으므로 주사 후 주의 깊게 관찰
 하십시오.
 - 2. 주사 중 또는 직후에 오심, 구토, 복통, 사지경련 또는 마비
 와 같은 증상이 나타날 때에는 즉시 투여를 중지하고 수의사
 의 지시에 따라 쇼크에 대한 처치를 곧바로 실시 하십시오.
 - 다. 상호작용
 마크로라이드계(에리트로마이신), 아미노글리코사이드계,
 클로람페니콜계 및 테트라사이클린계 항생물질과 병용하지
 마십시오.
 - 라. 임신, 수유축, 신생축, 어린 가축, 쇠약축 등에 대한 투여
 임신중인 동물은 주사 스트레스를 받기 쉬우므로 항상
 신중하게 투여하십시오.
 - 마. 적응상의 주의
 - 1. 사용 전 본제를 주사용수 또는 희석액에 완전히 용해시킨
 후 사용하십시오.
 - 2. 사용 전 주사액을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후
 사용하십시오.
 - 3. 다른 약제와 혼합하여 사용하지 마십시오.
 - 4. 멀균된 주사기와 주사바늘을 사용하여 1두 1침의 원칙
 으로 사용하십시오.
 - 5. 주사방법이 잘못되면 통통, 경결 및 화농이 생길 수
 있습니다.
 - 6. 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사부위
 에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 주사부위를 70%
 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.
 - 7. 주사 시 주시통증에 의해 접종자가 동물의 공격을 받을 수
 있으므로 안전사고에 주의하십시오.

바. 휴약기간 소 : 28일 (우유 3일), 돼지 : 7일

사. 저장상의 주의사항

1. 안전사고 예방을 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의
 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
2. 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진
 저장방법을 준수하십시오.
3. 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게
 폐기처리 하십시오.
4. 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래
 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에
 보관하십시오.
5. 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로
 사용하지 마십시오.

[권고사항]

1. 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지
 마십시오.
2. 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
3. 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
4. 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지
 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
5. 오남용과 내성출현 예방을 위하여 동물용의약품의 사용
 내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
6. 오남용에 의한 약화사고 및 축산식품에의 전류 등을 초래할
 수 있으므로 정해진 용법 및 용량을 준수하십시오.
7. 본제를 투여하면서 동시에 동일성분의 약품을 중복투여
 하지 마십시오.
8. 휴약기간을 준수하지 않을 경우 동물의 체내에 악물이
 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수
 하십시오.
9. 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호 장구를 착용하여
 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하십시오.
10. 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉된 경우에는 즉시 깨끗이
 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를
 받으십시오.
11. 제품에 대하여 문의하실 사항이 있는 경우에는 제조사
 또는 수입사로 연락하여 주십시오.



고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부:(031)478-5560(대표)

www.kbnp.co.kr

