



돼지 파보 사독백신

10ml x 10



성분 및 함량(1두분당)

- 불활화된 돼지 파보바이러스 조직배양세포 감염배양액 (포르말린 0.5% 함유) $10^{4.5} \text{TCID}_{50}$ 이상
- 수산화알루미늄 겔 20%

효능 및 효과

- 돼지 파보바이러스 감염증을 예방

용법 및 용량

- 초산돈: 종부 2~4주전에 5ml씩 근육주사
- 경산돈: 이유시에 2ml씩 보강접종
- 웅돈: 8개월령에 5ml씩 근육접종 후 6개월마다 2ml씩 보강접종

저장방법 및 유효기간

- 저장방법: 2~5°C 냉장소에서 보관
- 유효기간: 제조일로부터 21개월간 유효

주의사항

- 건강한 돼지에만 접종하십시오.
- 냉장 보관한 백신을 25~30°C 정도로 따뜻하게 하여 잘 섞은 후에 접종하십시오.
- 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.

- ✓ 파보바이러스에 의한 유사산 예방 백신
- ✓ 경제적인 가격과 뛰어난 방어효과
- ✓ 초산돈 및 웅돈 5mL 접종
- ✓ 백신접종반응이 거의 없는 안전한 백신