

사료첨가 내외부 구충제

조달청 식별번호 22782503

# 슈퍼 멕 프리믹스



1 kg

**■ 원료약품 및 분량(본제 1kg 중)**

- [유효성분] 이버멕틴(Ivermectin, 별규) 6.12g
- [첨가제] 경질유동파라핀(Light liquid paraffin, KP)  
디부틸히드록시톨루엔(BHT, KVP) 탄산칼슘(Calcium carbonate, 별규)  
밀기울(Wheat Bran, 별규)

**■ 효능 및 효과**

**아래 축종의 기생충 구제**

학 명	기생충명
<i>Ascaris suum</i>	돼지회충
<i>Ascarops strongylina</i>	돼지위충
<i>Hyostrongylus rubidus</i>	홍색모양선충
<i>Oesophagostomum spp.</i>	장결절충속
<i>Metastrongylus apri</i>	돼지폐충
<i>Strongyloides ransomi</i>	돼지분선충
<i>Stephanurus dentatus</i>	돼지신충
<i>Trichuris suis</i>	돼지편충
<i>Haematopinus suis</i>	돼지이
<i>Sarcoptes scabiei var. suis</i>	개선충

**■ 용법 및 용량**

체중 kg당 본제 16.3mg(이버멕틴으로서 0.1mg)을 1일 1회 7일간 경구투여하십시오.

※ 모든, 웅돈에 개체 투여할 경우는 다음의 공식에 의하여 본제의 혼합량을 계산하여 구충할 돼지가 7일간 섭취할 사료에 혼합하여 투여하십시오.

\* 본제 혼합량(g) =  $\frac{\text{평균체중(kg)} \times \text{구충할돼지수(마리)} \times 7(\text{일})}{60}$

**- 사료 혼합투여시 참고표 -**

대상동물(체중)	사료 섭취량	투여 용량	
		이버멕틴 함량(ppm)	사료 톤당 본제 혼합량
어린돼지(40kg이하)	50g/kg(체중)	2.0	333g
육성돈(40~100kg)	42g/kg(체중)	2.4	400g
	2kg/일	10	1.67kg
모돈(200kg)	2.5kg/일	8	1.33kg
	3kg/일	6.7	1.1kg
웅돈(250kg)	2.5kg/일	10	1.67kg
	3kg/일	8.3	1.39kg

**■ 저장방법 및 사용기간**

- 가. 저장방법 : 실온(1~30℃)에 보관(기밀용기)하십시오.
- 나. 사용기간 : 제조일로부터 24개월

**■ 주의 사항**

**가. 다음 환축에게는 투여하지 마십시오.**

본 약제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.

**나. 부작용**

1. 과민반응으로 인해 영양결핍, 저단백혈증, 발진, 가려움증 등 증상이 나타날 수 있습니다.
2. 개체에 따라 GABA의 신경전달억제작용 증강으로 경련, 침울, 운동실조증, 마비 등을 유발할 수 있으며 부작용이 관찰되면 투여를 중단하십시오.
3. 모태독성용량에서는 태자기형을 유발할 수 있으므로 모돈에서는 특히 과용량을 투여하지 마십시오.

**다. 상호작용**

다른 약제와 혼합하여 사용하지 마시고 동일 성분의 다른 약제도 중복투여하지 마십시오.

**라. 적용상의 주의사항**

사료에 혼합하여 투여 시 정확한 용량을 준수하여 균등하게 혼합하여 사용하십시오.

**마. 휴약기간 : 돼지 : 28일**

**바. 저장상의 주의사항**

1. 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
2. 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
3. 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
4. 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.
5. 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

**[권고사항]**

1. 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
2. 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
3. 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
4. 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
5. 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물용의약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
6. 오남용에 의한 약화사고 및 축산식품에의 잔류 등을 초래할 수 있으므로 정해진 용법 및 용량을 준수하십시오.
7. 본제를 투여하면서 동시에 동일성분의 약품을 중복 투여하지 마십시오.
8. 휴약기간을 준수하지 않을 경우 동물의 체내에 약물이 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.
9. 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호 장구를 착용하여 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하십시오.
10. 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉된 경우에는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
11. 제품에 대하여 문의하실 사항이 있는 경우에는 제조사로 연락하여 주십시오.



충남 예산군 신암면 추사로 235-9  
영업부: (031)478-5560(대표)

