

# 대장균·살모넬라 클리닝 솔루션 카프란 200 액

처방대상동물용의약품

동물용의약품

휴약기간준수



## ■원료 약품 및 분량(본제 1L 중)

가. 유효성분 아프라마이신황산염(Apramycin Sulfate, 별규) 200g(역가)

나. 첨가제

파라옥시벤조산메틸(Methylparaben, KP) 2.0g

파라옥시벤조산프로필(Propylparaben, KP) 0.4g

피로아황산나트륨(Sodium Pyrosulfite, KP)

정제수(Purified water in Bulk, KP)

## ■효능 및 효과

가. 대상동물 : 닭(육계)

나. 적응증 : 대장균증(*E.coli*) 및 추백리(*Salmonella pullorum*)에 의한 설사 치료

## ■용법 및 용량

닭(육계)에 음수 1L 당 본제 0.625~1.25mL(아프라마이신으로서 125~250mg) 비율로 희석하여 1일 1회 5일간 경구투여

## ■저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 직사광선을 피하여 건조한 실온(1~30°C)에 보관

나. 용기종류 : 기밀용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

## ■주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

본제 및 아미노글리코시드계 항생물질에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

아미노글리코시드계는 신독성, 이독성 등이 나타날 수 있습니다.

다. 일반적 주의사항

- 교차오염을 방지하기 위하여 약제 투여 전후에 급수관 및 음수통을 세척하십시오.
- 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.

## 라. 상호작용

본제는 Beta-lactam antibiotics, cephalosporins, loop, osmotic, nephrotoxic drugs 등과 병용하지 마십시오.

## 마. 적용상의 주의사항

[대상동물에 대한 주의사항]

- 음수에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여 목적을 달성할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.

- 오남용에 의한 약화사고 및 축산식품에의 잔류 등을 초래할 수 있으므로 정해진 용법 및 용량을 준수하십시오.

- 본제와 동일성분의 약품을 중복투여하지 마십시오.

[취급자에 대한 주의사항]

- 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호장구를 착용하여 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.

- 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉된 경우에는 즉시 씻어내고 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

바. 휴약기간 : 닭 14일(산란계 사용 금지)

사. 저장상의 주의사항

1) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오.

2) 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.

3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.

4) 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 햇빛이 차단된 장소에 보관하십시오.

5) 빈 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

아. 기타 주의사항

1) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

2) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

3) 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물용의약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.

4) 휴약기간을 준수하고, 휴약기간 동안 동물이 오염된 사료, 물, 배설물 등을 통하여 약물에 노출되지 않도록 주의하십시오.

5) 제품에 대하여 문의하실 사항이 있는 경우에는 제조사로 연락하여 주십시오.

 고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부:(031)478-5560(대표)