

TULATHRON

효과는 물론 사용 편리성까지 생각한 툴라주사제

툴렉신

TULATHROMYCIN INJECTABLE SOLUTION



툴렉신-주

소(牛) 호흡기 폐렴 및 돼지(豚) 흉막폐렴 · 파스튜렐라 폐렴 · 마이코 폐렴에 효과적인 치료용 주사제로서 폐렴 치료효과는 물론 써코백신과 카테일 및 잔량 보관 시에 침전물(찌꺼기)이 생기기 않는 등 편리성까지 더하였습니다.



✓ 써코백신과 카테일 사용 가능

써코노플러스 및 polymer 함유 써코백신과 혼합 후 4시간 경과시까지 침전 없이 혼합도가 유지되었습니다. *

✓ 잔량 보관 시, 침전 미발생

사용 후 잔량을 냉장고에 5일간 보관 시에 침전물(찌꺼기) 등 이물발생 없이 무색 투명한 액상을 유지하였습니다. *

* 내부시험자료(Internal Data)

원료약품 및 분량	본제 1mL 중 툴라스로마이신 100mg	
효능 및 효과	[돼지] - 흉막 폐렴 / 파스튜렐라성 폐렴 - 마이코플라즈마성 폐렴	[소] - 만헤이미아 폐렴 / 파스튜렐라 폐렴 - 헤모필러스 폐렴 - 마이코플라즈마성 폐렴 - 전염성 결막염
용법 및 용량	[돼지] 체중 40kg 당 본제 1mL를 이근부 1회 근육주사 한 부위에 투여하는 주사량이 2mL를 넘지 않도록 한다.	[소] 체중 40kg 당 본제 1mL를 목 부위에 1회 피하주사 한 부위에 투여하는 주사량이 5mL를 넘지 않도록 한다
휴약기간	돼지 33일, 소 49일(착유우 사용 금지)	

