

# 개 파보 사독백신

Canine Parvovirus inactivated vaccine



## 원료 및 함량

- ▶ 개파보바이러스세포감염 불활화액 (512HA unit 이상) ..... 80%
- ▶ 수산화알루미늄겔 ..... 20%

## 효능 및 효과

- ▶ 개파보바이러스 감염증의 예방

## 용법 및 용량

- ▶ 개의 체중, 품종에 관계없이 모체 이행항체 수준에 따라 접종시기를 정함.
- ▶ 일반적으로 생후 4~6주 후에 1차, 생후 7~9주 후에 2차 추가 접종하며 근육 혹은 피하로 1ml씩 주사하고, 매년 1회 보강접종

## 저장방법 및 유효기간

- ▶ 제조일로부터 24개월
- ▶ 2~8°C 냉암소 보관

## 주의사항

- ▶ 냉장상태의 백신을 바로 접종하지 마십시오.
- ▶ 임신한 개에게는 사용하지 마십시오.
- ▶ 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.

포장단위 : 1두분 x 50



# 개 파보바이러스 사독백신



## 원료 및 함량

- ▶ 개 파보바이러스 세포감염 불활화액 (512 HA unit 이상) ..... 80%
- ▶ 수산화알루미늄 겔 ..... 20%

## 효능 및 효과

- ▶ 개 파보바이러스 감염증의 예방

## 용법 및 용량

- ▶ 개의 체중, 품종에 관계없이 모체이행항체 수준에 따라 접종시기를 정함.
- ▶ 일반적으로 생후 4~6주 후에 1차, 생후 7~9주 후에 2차 추가 접종하며 근육 혹은 피하로 1ml씩 주사하고, 매년1회 보강접종

## 저장방법 및 유효기간

- ▶ 제조일로부터 24개월
- ▶ 2~8℃냉암소 보관

## 포장단위 : 1두분 x 50

## 주의사항

- ▶ 냉장상태의 백신을 바로 접종하지 마십시오.
- ▶ 임신한 개에게는 사용하지 마십시오.
- ▶ 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.

