

수산용동물용의약품
 휴약기간 준수
 처방대상동물용의약품

1 kg

에리트로마이신·설파제·트리메토프림 합제

수산용 에스트림산



■원료 약품 및 분량 (본제 1kg 중)

- 에리트로마이신티오시아네이트(별규) ----- 90g(역가)
- 설파디아진나트륨(KVP) ----- 75g
- 트리메토프림(KVP) ----- 15g

■효능 및 효과

- 에리트로마이신, 설파디아진 및 트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

가. 방어

연쇄구균증(*Lactococcus garvieae*)
 비브리오병(*Vibrio anguillarum*)

나. 송어(연어과어류)

세균성신장병(*Renibacterium salmoninarum*)
 비브리오병(*Vibrio ordalii*)

다. 뱀장어

기적병(지느러미적병, *Aeromonas hydrophila*)
 에드워드병(*Edwardsiella tarda*)

라. 조피볼락

연쇄구균증(*Streptococcus sp.*)
 비브리오병(*Vibrio ordalii*)

마. 넙치

연쇄구균증(*Streptococcus sp.*)
 비브리오병(*Vibrio anguillarum*)
 에드워드병(*Edwardsiella tarda*)

■용법 및 용량

- 어체중 1ton당 본제 125~350g/일을 사료에 고르게 혼합하여 5~7일간 경구투여

■저장방법 및 유효기간

- 건냉암소(1~15℃)에 보관, 기밀용기
 - 제조일로부터 24개월

■주의사항

가. 다음 어류에는 투여하지 말 것

본제 및 Macrolide계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 어류에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

본제를 6일 이상 연속투여 시 섭이량 저하, 섭이거부, 행동, 체력저하, 경련, 설사 등의 이상이 나타날 수 있습니다.

다. 상호작용

Lincosamide계 및 다른 Macrolide계 항생제와 병용하지 마십시오.

라. 적용상의 주의

사료에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여목적 달성을 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.

마. 휴약기간

방어, 송어(연어과어류), 뱀장어, 조피볼락, 넙치 : 30일

바. 저장상의 주의사항

1. 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
2. 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
3. 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
4. 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.
5. 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.



4254010
140808

KBNP 고려비엔피