

효과 빠른 알칼리 엔로 주사제

케녹신 50주



Living together, Growing together!

케녹신 50주

호흡기질병

- 파스튜렐라 페럼
- 글래서씨균
- 홍막폐렴
- AR
- 마이코플라즈마



- 대장균
- 살모넬라
- 장독혈증
- 로소니아(회장염)


소화기질병



케녹신 50주

- 대장균
- 포도상구균
- 연쇄상구균

유사산 & MMA




Living together, Growing together!

케녹신 50주 → 호흡기 치료 효과 비교



	케녹신	페니실린	OTC/ CTC	FF	마크로라이드
세포내확산	매우 높음	낮음	좋음	매우 좋음	매우 좋음
세포내활성	높음	다양	좋음	좋음	다양
작용기전	살균작용	살균작용	정균작용	정균작용	정균작용
파스튜렐라	+++	++	+	+++	+
흥막폐렴	+++	+	+++	+++	+
마이코	+++	-	+	++	++
위축성비염	+++	+	-	+	-
글래서씨균	+++	++	++	+++	++

케녹신 50주 → 소화기 치료 효과 비교



	케녹신	페니실린	OTC/ CTC	폴리펩타이드	마크로라이드
세포내확산	매우 높음	낮음	좋음	매우 좋음	매우 좋음
세포내활성	높음	다양	좋음	좋음	다양
작용기전	살균작용	살균작용	정균작용	정균작용	정균작용
대장균	+++	+	+	++	+
살모넬라	+++	+	+	+	+
로소니아	+	+	-	-	++
장독혈증	++	++	+	-	+

국내 소화기 치료제 내성 현황(살모넬라)

항생/항균제	내성 마리수(%)	
	돼지(15마리)	닭(20마리)
아목시/클라불릭산	0(0)	0(0)
암피실린	2(13.3)	0(0)
세파졸린	2(13.3)	0(0)
세프티오퍼	0(0)	0(0)
세팔로틴	0(0)	0(0)
클로람페니콜	8(53.3)	0(0)
시프로/엔로플록사신	0(0)	0(0)
콜리스틴	0(0)	0(0)
플로르페니콜	7(46.7)	0(0)
겐타마이신	0(0)	11(55.0)
나리디식산	6(40.0)	20(100)
네오마이신	5(33.3)	0(0)
스트렙토마이신	8(53.3)	14(70.0)
테트라싸이클린	15(100)	0(0)
트리메토/설파메톡사졸	5(33.3)	0(0)

국내 소화기 치료제 내성 현황(분변 내 대장균)

항생/항균제	내성 마리수(%)		
	소(121마리)	돼지(239마리)	닭(169마리)
아목시/클라불릭산	0(0)	1(0.4)	2(1.2)
암피실린	21(17.4)	153(63.5)	88(51.8)
세파졸린	2(1.7)	3(1.2)	3(1.8)
세프티오퍼	2(1.7)	3(1.2)	1(0.6)
세팔로틴	0(0)	14(5.8)	5(2.9)
시프로/엔로플록사신	0(0)	17(7.1)	63(37.1)
클로람페니콜	3(2.5)	120(49.8)	16(9.4)
콜리스틴	8(6.6)	8(3.3)	0(0)
플로르페니콜	9(7.4)	122(50.6)	25(14.7)
겐타마이신	0(0)	33(13.7)	28(16.5)
나리디식산	4(3.3)	55(22.8)	124(72.9)
네오마이신	18(14.9)	101(41.9)	11(6.5)
스트렙토마이신	59(46.3)	199(83.3)	106(62.4)
테트라싸이클린	54(44.6)	199(83.3)	137(80.6)
트리메토/설파메톡사졸	8(6.6)	78(32.4)	70(41.2)

케녹신 50주 → MMA 치료 효과 비교



	케녹신	페니실린	OTC/ CTC	마크로라이드	설파제
세포내확산	매우 높음	낮음	좋음	매우 좋음	다양
세포내활성	높음	다양	좋음	다양	낮음
작용기전	살균작용	살균작용	정균작용	정균작용	정균작용
대장균	+++	+	+	+	++
엔테로	+++	+	+	-	+
연쇄상구균	++	+++	+	++	++
포도상구균	+++	+++	+	++	++

케녹신 50주의 사용이점들

- 광범위 살균작용으로 호흡기 · 소화기질병 및 MMA에 탁월한 효과를 보입니다.
- 빠르게 감염조직에 확산, 분포하여 살균작용을 합니다
- 높은 순도의 알칼리 원료를 사용하여 치료 효과가 확실합니다.



케녹신 50 주

성분 및 분량 (1ml 중)

엔로플록사신 (Enrofloxacin)	50mg
수산화칼륨	적량
벤질알콜	적량
주사용수	적량

효능 및 효과

- 소 : 대장균성 설사와 패혈증, 마이코플라즈마증, 살모넬라감염증, 파스튜렐라성 기관지 폐렴 치료
- 돼지 : 대장균성 설사와 장독혈증, 살모넬라감염증, 마이코플라즈마성 폐렴, 파스튜렐라폐렴, 홍막폐렴
- 개, 고양이 : 비노생식기 감염증(방광염, 신우신염), 외상수술 후 2차 감염, 피부질병

용법 및 용량

소, 개, 고양이 - 피하주사
돼지 - 근육주사

- 일반 세균성 질병
소 / 돼지 - 1일 체중 10kg 당 0.5ml씩 3일 투여
개 / 고양이 - 1일 체중 kg 당 0.1ml씩 5~10일 투여
- 중증의 호흡기, 세균성질환 소화기질환
소 / 돼지 - 1일 체중 10kg당 1ml씩 3~5일 투여
- 살모넬라증 치료
소 / 돼지 - 1일 체중 10kg 당 1ml씩 5일 투여



저장방법

건냉암소(1~25°C)에 보관

유효기간

제조일로부터 24개월

주의사항

- 어린 연령의 개에게는 투약을 금지합니다.
- 냉장상태의 약을 바로 접종하지 마십시오.
- 휴약기간 - 돼지 : 20일, 소 : 20일, 우유 : 4일
- 자세한 내용은 설명서 참조하십시오.