



돼지 흉막 폐렴 예방치료제 펜콜플러스

성분 및 함량

플로르페니콜(Florfenicol) 40g

효능 및 효과

플로르페니콜에 감수성이 있는 돼지 세균성감염증(호흡기질병)의 예방 및 치료 - 흉막폐렴(*A. pleuropneumoniae*)

용법 및 용량

1일 사료 톤당 본제 0.5~1Kg (플로르페니콜로서 20~40ppm)을 사료에 혼합하여 경구 투여

저장방법 및 유효기간

저장방법 : 직사광선을 피하여 건조하고 어두운 실온(8~25℃)에 보관
유효기간 : 제조일로부터 24개월

포장단위: 5kg

주의사항

- 1주일 이상 계속 사용하지 마십시오.
- 10배이상 과다 투여 시 일시적으로 설사를 할 수 있습니다.
- 휴약기간 : 돼지 -3일
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 수의사의 처방 및 지시에 따라 사용 하십시오.
- 지정된 가축에만 사용 하십시오.
- 정하여진 용법·용량을 준수 하십시오.
- 휴약 기간을 반드시 준수 하십시오.
- 설명서를 충분히 읽어본 후 사용 하십시오.

[흉막폐렴 1,2형에 대한 억제농도]

성분명	MIC90
Florfenicol(펜콜플러스)	1
Amoxicillin(아목시실린)	16
Linco/Spectinomycin(린스마이신)	16

1995, 이탈리아 자료

✓ 돼지 흉막폐렴 발생시, 우선처치용 사료첨가제

✓ 봄, 가을 환절기 클리닝 제제

✓ 빠른 흡수와 폐 등 감염부위 분포로 빠르게 질병을 치료

✓ 짧은 휴약기간과 뛰어난 안전성

