

수산용동물용의약품
치방대상동물용의약품
휴약기간 준수

고농도 에리트로마이신제제

수산용 에리신



1kg

■원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)

- 에리트로마이신티오시아네이트(별규)
----- 200g(역가)
- 유당수화물(KVP) ----- 적당량
- 포도당(KVP) ----- 적당량

■효능 및 효과

- 에리트로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병을 치료합니다.
- 가. 연어과 어류(송어) :
세균성신장병(*Renibacterium Salmoninarum*)
연쇄구균증(*Streptococcus sp.*)
- 나. 방어: 연쇄구균증(*Lactococcus garvieae*)

■용법 및 용량

- 가. 세균성 신장병: 어체중 1톤당 본제 200~500g/일(에리트로마이신으로서 40~100g 역가)을 사료에 혼합하여 21일간 경구투여
- 나. 연쇄구균증: 어체중 1톤당 본제 125~200g/일(에리트로마이신으로서 25~40g 역가)을 사료에 혼합하여 5일간 경구투여

■저장방법 및 유효기간

- 저장방법: 건냉암소(1~15℃)에 보관
- 용기종류: 기밀용기
- 유효기간: 제조일로부터 24개월

■주의사항

- 가. 다음 어류에는 투여하지 말것
본제 및 Macrolide 계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 어류에는 사용하지 마십시오.
- 나. 부작용
본제를 6일 이상 연속투여시 섭이량 저하, 섭이 거부, 행동, 체력저하, 경련, 설사 등의 이상이 나타날 수 있습니다.

다. 상호작용

Lincosamide계 및 다른 Macrolide계 항생제와 병용하지 마십시오.

라. 적용상의 주의

사료에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여목적을 달성할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.

마. 휴약기간

• 연어과어류(송어) : 30일 • 방어 : 14일

바. 저장상의 주의사항

1. 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
2. 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 경하여진 저장방법을 준수하십시오.
3. 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
4. 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.
5. 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.



4008000
130916