



엑소더스의 효과



고려비엔피

Case 1

- 농장주: J. D. W
- 주 소: 흥북면 매덕리
- 축 종: 육계
- 엑소더스투약 수수: 14,000수 (총수수:30,500수)
- 시 설: 트랜스형 계사 (4개동)
- 사육기간: 2012.11.15~12.17(33일 사육)
- 출하체중 1,860kg



적용 및 결과

- 시험수수 : 14,000수 (총4개동 중 2개동)
- 투약량 : 700ml / 10,000수
- 투약시기 : 출하 하루전과 당일
- 투약결과 : - 사료 섭취량 변동없음
- 출하당일 체중 증체 및 상차후 계근시 감량감소 효과
- **농장에서 도계장 이동시 발생하는 폐사 감소 확인**

사육일령	무 첨가군	엑소더스첨가군
31일령	1,500g	1,670g
32일령	1,600g (+100g)	1,790g (+120g)
33일령	1,640g (+40g)	1,860g (+70g)

Case 2

- 농장주: L. Y. J.
- 주 소: 당진시 면천면 성하리 36-4번지
- 축 종: 육계
- 엑소더스 투약수수: 18,000수(총수수:40,000수)
- 시 설: 트랜스형 개방 계사
- 사육기간: 2012.11.11~12.13 (31일사육)
- 출하체중 1,580kg



적용 및 결과

- 시험수수 : 총 18,000수 (총 4개동중 2개동 적용)
- 투약량 : 1L / 10,000수
- 투약시기 : 출하 전날과 당일
- 투약결과
 - 이동스트레스로 인한 폐사 감소하는 것을 농장주가 느낌
 - 29일령 = 1,430kg
 - 30일령 = 1,520kg
 - 31일령 = 1,580kg

Case 3

- 농장주: K. E. H.
- 주 소: 홍성군 구항면
- 축 종: 육계
- 엑소더스 투약수수: 34,000수 (총사육수수: 70,000수)
- 시 설: 하우스형 계사
- 사육기간: 2012.11.19~12.21 (33일사육)
- 출하체중 1,760kg
- 특이사항: 두 계군 입추



적용 및 결과

- 투약수수 : 34,000수
- 투약량 : 물 1ton당 모두 동일하게 1L 급여
- 투약시기
 - 7 - 10일령(4일간) - 약추가 느는듯한 느낌
 - 19 - 22일령(4일간) - 4일째 연변소견
 - 28 - 31일령(4일간) - 4일째 연변소견
- 투약결과 :
 - 4일간 급여한 경우 3일째부터 약간의 연변
 - 4일째는 연변하는 닭들이 눈에 띄게 나타남
 - 급여했던 엑소더스의 효과는 눈에 띄지 않음
 - 연변으로 인하여 증체가 잘 이루어지지 않은 것으로 농장주는 생각
- 31일령 = 1,610kg
- 32일령 = 1,720kg(120g 증체)
- 33일령 = 1,760kg(40g증체)

결론

- 투약량 : 500ml~1L /ton
- 투약시기 : 출하전일과 당일
- 투약결과
 - 출하당일 체중 증체 및 상차후 계근시 감량감소 효과
 - 상차후 이동시 발생하는 폐사 감소

* 주의사항 : 3일이상 투약시 연변 발생 염두