

## 수산전용 세파계 광범위 항생제

# 수산용 아반떼(세프티오퍼)주



## ■ 원료약품 및 분량(본제 1g 중)

[유효성분] - 세프티오퍼 나트륨(Ceftiofur sodium, 별규)  
----- 1,000mg(역가)

## ■ 세형 및 성상

- 세형 : 주사제 (항병원성학 - 항생제)
- 성상 : 흰색에서 짙은 갈색의 결정성 가루

## ■ 효능 및 효과

- 세프티오퍼에 감수성이 있는 아래 세균성 질병의 치료  
가. 낚치(Olive flounder) : 연쇄구균증  
(*Streptococcus iniae*, *S. parauberis*)

## ■ 용법 및 용량

- 본제 1g(역가)을 주사용 증류수 20mL의 비율로  
회석하여 어체중 1kg당 본제 0.2mL (세프티오퍼로서  
10mg/kg) 1일 1회 근육에 주사하십시오.

## ■ 저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 직사광선을 피하여 실온(1~30°C)에서  
보관(밀봉용기)하십시오.
- 유효기간 : 제조일로부터 24개월

## ■ 주의사항

## 가. 다음의 동물에는 사용하지 마십시오.

- 본제 및 다른 세팔로로스포린계 항생물질에 대한 소크와  
과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.

## 나. 부작용

- 1) 근육주사 부위에 주사바늘 자국이 남을 수 있으며  
울비를 방법으로 주사하지 않을 시 상처는 40일 이상  
지속될 수 있습니다.
- 2) 수온에 따라 일주일 정도 흥분된 움직임이 발생할 수  
있으며 고수온에서 더 심할 수 있습니다.
- 3) 접종 후 최소 2일 동안은 먹이 투여 시 소화장애와  
염증이 유발될 수 있습니다.

## 다. 상호작용

- 1) 아미노글리코시드계, 페니실린계 및 클로람페니콜계  
항생물질과 병용하지 마십시오.
- 2) 비행구용 아미노글리코시드계 및 암포테리신B 등  
신장 독성이 있는 약물과 병용하지 마십시오.

## 라. 사용상의 주의사항

- 1) 스크루ти카풀 등 기생충에 감염되어 있을 경우에는  
접종부위에 감염이 우려되므로 사용을 자제하여  
주시기 바랍니다.
- 2) 지정된 어종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어  
있지 않으므로 15cm 이상의 날치에서만 사용하고  
반드시 근육으로 주사하십시오.
- 3) 주사 접종 하루 전 절식을 시키십시오.
- 4) 해당 사육수온(15°C 이하, 26°C 이상)에서는 어류의  
안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 주사접종을  
하지 마십시오.
- 5) 접종 후 최소 2일 동안은 먹이 투여를 자제하고  
1주일 후 식욕이 회복되는지 확인하십시오.
- 6) 용법 용량을 준수하여 투여기간동안 동일성분의  
다른 약제를 투여하지 마십시오.

7) 타 동물용의약품과 병용 투약 시는 반드시  
수산질병관리사 또는 수의사와 상의하십시오.

8) 한 부위에 수회 접종 주사하지 마십시오.

9) 접종 후 약 10일 동안 채포, 이동 및 청소 등은  
가능한 피하시기 바랍니다.

10) 오·남용에 의한 악화사고 및 수산식품에 잔류 등  
경제적 손실을 초래할 수 있으므로 경해진  
용법·용량을 준수하십시오.

11) 투약 시 충분한 산소를 공급하고 수온, 질소산화물,  
염분농도 등 수질관리에 유의하고 투약할 어군이  
최대한 스트레스를 받지 않도록 하십시오.

12) 적절한 방법으로 근육주사 후 30일 이내에는  
주사부위에 주사자국이나 염증이 지속될 수 있습니다.  
(안전출하기간 : 주사 후 최소 30일 이후 권장)

13) 해당 사육수온 (15°C 이하, 26°C 이상)에서 근육주사  
하거나 울비를 방법으로 보관하지 않은 주사제를  
사용 시 주사로 인한 상처가 40일 이상 지속될 수  
있습니다.

## 마. 휴약 기간

- 네치 : 7일

## 바. 저장상의 주의사항

- 1) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고,  
동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 2) 유효성 및 안정성에 변화를 초래 할 수 있으므로  
정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고  
안전하게 폐기 처리하십시오.

4) 오용 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 용기나  
포장지 이외의 다른 용기에 소분하여 보관하지  
마십시오.

5) 다른 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고  
다른 용도로 사용하지 마십시오.

6) 회석된 주사제는 당일 사용을 원칙으로 하며  
남은 주사제는 안전하게 폐기하십시오.

## 사. 기타

- 1) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후  
사용하십시오.
- 2) 수산질병관리사 또는 수의사의 지시에 따라  
사용하십시오.
- 3) 본 제품은 수산용 동물용의약품이므로  
사람에게는 절대 사용하지 마십시오.
- 4) 기타 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우  
제조사로 연락해 주시기 바랍니다.

## ■ 포장단위(내용량)

- 1g, 4g, 10g, 25g, 50g

**KBNP 고려비엔피**

충남 예산군 신암면 추사로 235-9  
영업부: (031)478-5560(대표)  
[www.kbnp.co.kr](http://www.kbnp.co.kr)