

구제역 백신 접종시 유의사항



구제역 백신의 부형제로 오일을 사용하므로 발열, 쇼크 및 유사산 발생등이 가능하며, 접종한 부위에 일시적인 부종이 형성될 수 있습니다. 이러한 부작용을 최소화 하기 위해 아래 사항들이 권장됩니다.

백신을 25~30℃ 정도로 따뜻하게 한 후 접종합니다

- ✓ 냉장고에서 바로 꺼내어 접종하면 쇼크, 발열 등 과민반응이 나타날 수 있습니다.
- ✓ 30℃ 정도의 물에 30 분 이상 담구거나 보온등 0.5m 아래에서 약 30 분 이상 가열하는 등 충분히 따뜻하게 한 후 백신을 잘 흔들어서 사용하십시오.

알맞은 주사 바늘을 선택하고 접종 시 주사바늘을 자주 교환합니다.

- ✓ 모든은 인근부 지방층이 두껍기 때문에 1½ ~ 1¾인치를 권장합니다.
- ✓ 무더진 주사바늘은 불필요한 상처 및 통증을 유발하고, 주사부위의 농양을 발생시킬 수 있습니다.
- ✓ 주사바늘 교환은 1 두 1 침을 하여 전염성 질병의 전파를 차단해야 합니다.

주사바늘이 직각이 되도록 보정하고, 근육 내에 주사합니다.

- ✓ 사선으로 접종하면 피하·피내 및 지방층에 주사되어 농양이 발생할 수 있습니다.
- ✓ 돼지가 심하게 흔들면 진정한 후에 접종하십시오.

예방적 투여를 권장합니다.

- ✓ 백신접종 전날부터 2~3 일간 해열·소염·진통제를 투약하십시오.
 - 사료 톤 당 **카스피린 C** 1.0kg 첨가
- ✓ 백신접종 전날부터 2~3 일간 항생제를 투약하십시오.
 - 사료(음수)톤 당 **고려 암피실린-100** 1.0kg 첨가

긴급처치

- ✓ 식불이 발생하면 2~3 일간 해열·소염·진통제를 주사하십시오.
 - **막피린 주** 5~10ml