



염소

“흔들리” 뚝!



이제 흔들리지 말고, 일어나게 하세요.



스탠드업

염소 흔들이병?

- ☑ 생후 3~14일령의 새끼 염소에서 주로 발생하며
- ☑ 식욕 부진, 운동 실조, 균형 감각 상실 등의 증상이 나타나면서
- ☑ 24~36시간 후에 폐사하게 되는 새끼 염소의 치명적 질병(치사율 30~50%) 중 하나입니다.



염소 흔들이병?

- 설사 증상 및 탈수증상 없음
- 증상 발생 후 **24~36**시간 내 폐사





염소 흔들이병으로 인한 피해

- 성축 26만두 중 암컷 13만두 → 자축 30만두/년 생산
- 자축 30만두 중 흔들이 이병률 30% 적용
→ 9만두/년 흔들이 증상
- 9만두 중 폐사률 50% 적용
→ 4.5만두/년 흔들이 폐사
- 4.5만두 X 150,000원 → 67억원/년 손실



“흔들이” 똑!, 스탠드업(Stand up)

스탠드업은 흑염소 새끼들에게 극심한 피해를 주는 ‘흔들이’를 예방할 수 있는 동물용의약품으로서, 농림수산검역검사본부에서 개발하여 특허 출원된(제 10-2011-0100569호) 효과적인 약제입니다.



성분 및 함량 (본제 1L 중)

| | |
|--|-------|
| 탄산수소나트륨(Sodium bicarbonate, KVP 5) | 83.3g |
| 염화나트륨(Sodium chloride, KVP 5) | 4.5g |
| 부형제 | 적량 |

효능 및 효과

염소의 전해질 불균형에 의한 흔들이 증상 예방에 도움을 줌

용법 및 용량

본제를 잘 흔들어서 30ml를 경구로 급여
(6시간 후 상태가 좋아지지 않으면 본제 30ml를 추가로 급여)

저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 건냉암소에 보관
- 유효기간 : 제조일로부터 12개월간

주의사항

- 휴약기간 : 없음
- 약을 급여하는 동안 우유, 사료의 급여를 중지하십시오.
- 사용하기 전에 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- 설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 정하여진 용법·용량을 준수하십시오.
- 개봉한 제품은 가능한 한 빨리 사용하십시오.




흔들이 처치 후 산증 치료효과


스탠드업 투여 후의 혈액학적 변화

대상 : 생후 3~10일령, 평균 체중 3~4kg인 흔들이병 염소 8마리 및 정상 염소 7마리

■ pH의 변화



■ 락트산(D-lactate·L-lactate) 변화





흔들이병 발생 예방 및 치료 방법

☐ 치료 대책

- 증상 발생 시, 바로 “스탠드업” 투약
(6시간 후 증상이 호전되지 않으면 추가 1병 투약)
- 발병 시 모유 급여 중지(가능한 굶김)
- 겨울철 보온판, 보온등 등 이용한 보온관리 철저

☐ 어미 측면의 예방책

- 임신 및 출산 후 과도한 농후사료 급여 자제
- 방목장에서 충분한 운동 및 양질의 조사료 급여



염소

“흔들리” 뚝!



제품문의

☎ 070-7433-9000



스탠드업