



동물용의약품

돈호방 E2(돼지열병마커) 불활화 신

■ 원료약품 및 분량(본제 1두분종)

[유효성분] CSF 단백항원(gp55+IL2)	-----	60㎍
[면역증강제] IMS1313	-----	50%
[보존제] 포르말린	-----	0.2%이하

■ 성상

유백색 또는 연한 아이보리색의 흐릿한 부유액이며
이물 및 이취가 없고 내용물의 성상이 균일합니다.

■ 효능 및 효과

돼지열병의 예방 목적으로 사용하십시오.

■ 용법 및 용량

가. 자동 : 40일령 1차, 60일령 2차 근육에
1.0mL씩 접종하십시오.

나. 긴급방역용 : 1주 간격으로 3회 접종
(모돈·웅돈 등 번식돈 제외)

■ 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 2~8℃의 냉암소에 보관하십시오.

나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■ 주의사항

가. 다음 환경에는 투여하지 마십시오.

- 열이 있거나 영양장애가 심한 돼지
- 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 돼지
- 곰팡이 및 세균의 독소(아플리톡신, 대장균 및 살모넬라 독소)에 의해 면역기능이 저하된 돼지
- 이전에 본제 또는 본제의 성분에 과민반응이나 쇼크를 일으킨 일이 있는 돼지

나. 부작용

투여 후 개체에 따라 식욕부진, 구토, 피부발진, 허탈, 경련 등의 과민반응이 일어날 수 있습니다.
이런 경우 마사지, 애피네프린 투여가 권장되므로
수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.

다. 적용상의 주의사항

- 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 사용설명(주의사항)을 충분히 읽어본 후
사용하십시오.
- 사용 전 건강상태를 확인하여 건강한 돼지에만
사용하십시오.
- 오·남용에 의한 악화사고 및 경제적 손실을 초래할
수 있으므로 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
- 백신을 접종하기 전에 백신의 온도가 상온이
될 때까지 놓아두었다가 사용하십시오.

6) 접종 전에 반드시 백신의 성상을 관찰한 후
이상이 있으면 사용하지 마십시오.

7) 알었다가 녹은 제품은 효력이 없으므로
사용하지 마십시오.

8) 다른 백신 또는 약제와 혼합할 경우 상호간섭현상,
침전, 이물형성 등이 나타날 수 있으므로
절대 혼합하여 사용하지 마십시오.

9) 사용할 때마다 충분히 흔들어 사용하고
주사바늘은 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.

10) 백신접종 후 최소한 3~5일간 돼지가 안정을
취하도록 하십시오.

11) 투여경로를 달리는 경우 주사부위에 통증,
종창, 경결 및 쇼크 등이 나타날 수 있으므로
반드시 권장된 투여경로에 따라 주사하십시오.

12) 일단 개봉한 백신은 개봉 당일에 모두
사용하십시오.

13) 불량한 환경 및 주사부위가 오염된 경우에는
주사부위에 염증이 생길 수 있으므로 주사부위를
70% 알코올 등으로 소독 후 접종하십시오.

라. 기타 주의사항

- 안전사고 방지를 위하여 어린이 손이 닿지 않고
돼지의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 안전성 및 유효성이 변화를 초래할 수 있으므로
정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 접종 시기 산경과 만일의 경우를 위하여
사용 백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 접종일,
접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 다른 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고
다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 피부나 눈에 접촉 시에는 물로 깨끗이 씻어낸 후
이상증상이 있을 경우 즉시 의사의 진료를
받으십시오.
- 실수로 사람에게 주사한 경우에는 사용설명
(주의사항)을 지참하여 즉시 의사의 진료를
받으십시오.
- 기타 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으시면
제조사로 연락하여 주십시오.

■ 포장단위

10두분, 20두분, 30두분, 50두분, 100두분

