

돼지 흉막 폐렴 예방치료제

펜콜플러스



5kg

■ 원료약품 및 분량(본제 1kg 중)

- 플로르페니콜(Florfenicol, 별규 1) ----- 40g

■ 효능 및 효과

- 플로르페니콜에 감수성이 있는 돼지 세균성감염증(호흡기질병)의 예방 및 치료
가. 돼지: 흉막폐렴(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)

■ 용법 및 용량

- 다음의 용량을 1일 량으로 사료에 희석하여 경구 투여 하십시오.
사료 톤당 본제 0.5~1Kg(플로르페니콜로서 20~40ppm)을 혼합하여 투여

■ 저장방법 및 유효기간

- 직사광선을 피하여 건조한 실온(8~25℃)에 보관
- 기밀용기
- 제조일로부터 24개월

■ 주의사항

가. 적용상주의사항

- 1주일 이상 계속 사용하지 마십시오.

나. 부작용

- 10배이상 과다 투여 시 일시적으로 설사를 할 수 있습니다.

다. 휴약기간 : 돼지 -3일

라. 저장상의 주의

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

마. 기타 주의사항

- 수의사의 처방 및 지시에 따라 사용 하십시오.

- 설명서를 충분히 읽어본 후 사용 하십시오

- 지정된 가축에만 사용 하십시오

- 정하여진 용법·용량을 준수 하십시오

- 휴약 기간을 반드시 준수 하십시오.

- 제품 취급 시 피부에 닿았을 때는 즉시 비눗물로 씻으십시오.

- 제품이 눈에 들어갔을 때는 즉시 15분 이상 맑은 물로 닦아내고,
계속 자극이 남아있을 때는 의사의 처방을 받으십시오.

- 운송·저장 시 제품의 이상이나 변질이 있을 시에는 구입처에서
즉시 교환하시기 바랍니다.

내포장:



HDPE

4141500
141002

KBNP 고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부:(031)478-5560(대표)

