

소 타일레리아병 전문치료제

부타렉스 주사제



- ✓ 국내 유일 테일레리아 치료제
- ✓ 가장 최근에 개발된 효과 높은
타일레리아병(소형 파이로플라즈마병) 치료제
- ✓ 잠복기에도 동일한 효과
- ✓ 희석할 필요없는 간편한 사용
- ✓ 다른 항원충제와 병용가능

성분 및 분량

Buparvaquone	50mg/ml
Fractionated Coconut Oil B.P.	300mg
Sorbitan monooleate B.P.	100mg
N-Methyl pyrrolidone	500mg

효능 및 효과

소 타일레리아병(소형 파이로플라즈마병) 및 각종 원충성 질병의 치료 및 예방

용법 및 용량

- 체중 20kg 당 본제 1ml를 목부위에 근육주사
- 상태가 심한 경우 1차 주사 후 48~72시간 이내에 2차 접종

저장방법 및 유효기간

직사광선을 피하고 35°C 이하에서 보관하며, 제조일로부터 2년간 유효

포장단위 : 20ml x 10

주의사항

- 정맥주사 및 피하주사는 하지 마십시오.
- 투여량이 10ml을 넘을 경우, 목의 여러 부위에 나누어 주사하십시오
- 휴약기간 : 60일
- 납유를 목적으로 하는 젖소에는 사용을 금합니다.
- 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.

