


휴약기간 5일·콕시듐 치료제

디콕신 (디클라주릴) 액제

- **디콕신**의 휴약기간은 5일 입니다.
- **디콕신**은 맹장콕시듐이나 장콕시듐 원충에 광범위한 치료효과를 보입니다.
- **디콕신**은 콕시듐 치료로 인해 폐사율 감소, 증체율 증가로 인한 생산성 개선 효과가 있습니다.

- 콕시듐 감염 + 디클라주릴 치료 안함(100수)
- 콕시듐 감염 + 디클라주릴 치료(100수)



제품등록사항(허가번호 제 6-328호)

- 원료 약품 및 분량: 본제 1L 중 디클라주릴 25g
- 효능 및 효과
- 닭의 *Etenella*, *E.maxima*, *E.acervulina* 등에 의한 콕시듐 치료
- 용법 및 용량
- 음수 1톤 당 본제 50~100mL 비율로 희석하여 2일간 투여
- 닭 1일 체중 kg 당 본제 0.05~0.1mL 비율로 2일간 투여
- 휴약기간: 닭(육계) 5일
- 유효기간: 제조일로부터 24개월
- 보관방법: 직사광선을 피하여 건조한 실온 보관
- 기타 주의사항: 제품 설명서 참조