수용성 강력 광범위 항생제

1kg

마하마이신 수산용

- 고농도 OTC 제제
- 양식어류(무지개송어, 방어, 뱀장어, 양식패류)의 옥시테트라사이클린 감수성균에 의한 질병의 예방 및 치료
- 어류의 치사율저하



효능 및 효과

- 옥시테트라사이클린 감수성균에 의한 질병의 예방 및 치료

어종	대상 질병
송어 (연어과 어류)	아가미부식병(*Flavobaxterium columnare*) 비브리오병(*Vibrio anguillarum*) 절창병(*Aeromons salmonicida*) 궤양병(*Hemophilus piscium*) 세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*) 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*)
잉어	비브리오병(*Vibrio anguillarum*) 솔방울병(*Aeromonas hydrophilla*)
방어	류결절증(*Photobacterium damsela subsp. piscicida*)
메기	세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*) 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*)
뱀장어	지느러미적병(*Aeromonas punctata*)
참돔	비브리오병(*Vibrio anguillarum*)

고려비엔피
제품문의 ☎ 031-478-5570

㈜고려비엔피의 홈페이지 및 제공되는 공개자료는 네이버에서 제공하는 '나눔글꼴'을 이용하여 제작되었습니다.

마하마이신 수산용



용법 및 용량

- 경구투여시

– 아래와 같이 어체중 1톤당 본제를 사료에 혼합하여 투여

어종	질 병 명	제품 첨가량(g) 1일, 어체중 톤당	OTC로서 투약량(g) 1일, 어체중 톤당	투약기간 (일)
송어	아가미부식병	345	82.7	10
	비브리오병	42-208	10-50	3-7
	절창병	230-345	55.1-82.7	10
	궤양병	230-345	55.1-82.7	10
	세균성출혈성 패혈증	230-345	55.1-82.7	10
	슈도모나스병	230-345	55.1-82.7	10
잉어	비브리오병	42-208	10-50	3-7
	솔방울병	208-417	50-100	5
방어	류결절증	125-292	30-70	5
	세균성출혈성 패혈증	230-345	55.1-82.7	10
	슈도모나스병	230-345	55.1-82.7	10
뱀장어	지느러미적병	42-208	10-50	3-7
참돔	비브리오병	42-208	10-50	3-7

- 약욕시

어종	질 병 명	제품 첨가량(g) 1일, 어체중 톤당	OTC로서 투약량(g) 1일, 어체중 톤당	투약기간 (분)
참돔	비브리오병	104	25	30~60

고려비엔피
제품문의 ☎ 031-478-5570

마하마이신 수산용

성분 및 함량

옥시테트라사이클린염산염 ····· 240g(역가)

저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 실온(1~30℃)에 보관(기밀용기)
- 유효기간 : 제조일로부터 24개월



포장단위 : 1kg x 10

주의사항

- 본제 및 Tetracycline계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 어류에는 사용하지 마십시오.
- Tetracycline계 약물을 장기간 투여 시 비감수성 세균 및 진균의 과잉성장을 초래할 수 있습니다.
- Cephalosporin계, Penicillin계 및 다른 Tetracycline계 항생제와 병용하지 마십시오.
- 휴약기간
  송어 - 30일, 잉어 - 25일, 방어 - 20일, 뱀장어 - 30일, 참돔 - 20일(약욕시 5일)
- 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 지정된 어종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 사용설명서(주의사항)을 충분히 읽어본 후 사용하십시오
- 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
- 휴약기간을 준수하지 않을 경우 어체에 약물이 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.
- 오남용에 의한 약화사고 및 수산식품에 잔류 등 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법용량을 준수하십시오.
- 취급자는 장갑, 마스크, 보호의등 보호장구를 착용하여 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.
- 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

고려비엔피
제품문의 ☎ 031-478-5570