

# 개 파보바이러스 사독백신

본 백신은 개 파보바이러스를 배양세포에 접종·증식시켜 그 감염 배양액을 채취한 뒤 화학적으로 불활화시킨 다음 수산화 알루미늄겔에 흡착시켜 제조한 불활화 백신입니다.

## ■원료 약품 및 분량 (본제 1두분 중)

- 개 파보바이러스 세포감염 불활화액(512 HA unit 이상) ----- 80%
- 수산화알루미늄 겔(Aluminum Hydroxide Gel, KP) ----- 20%

## ■효능 및 효과

- 개 파보바이러스 감염증의 예방

## ■용법 및 용량

- 개의 체중, 품종에 관계없이 모체이행항체 수준에 따라 접종시기가 정해져야 하지만 일반적으로 생후 4~6주 후 1차, 생후 7~9주후에 2차 추가접종하며 근육 혹은 피하로 1mL씩 주사하고, 매년 1회 보강 접종합니다.

## ■저장방법 및 유효기간

- 냉암소(2~8℃)에 동결되지 않도록 보관
- 밀봉용기
- 제조일로부터 24개월

## ■주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

1. 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
2. 열이 있거나 영양장애가 심한 동물, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 동물, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 동물에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

1. 개체에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 허탈, 피부발진, 구토, 경련 등의 과민반응이 일어날 수 있으므로 주사 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 과민반응 시에는 수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.
2. 피하주사 후 주사부위의 통증, 종창, 경결 등이 나타날 수 있으므로 주사 후 마사지를 충분히 해주십시오.

다. 일반적 주의

- 모견의 백신접종여부, 접종횟수, 감염여부에 따라 자견의 면역형성이 달라질 수 있으므로 이를 고려하여 접종하십시오.
- 라. 임신, 수유축, 신생축, 어린 가족, 쇠약축 등에 대한 투여 임신 중인 개에 사용하지 마십시오.

마. 적용상의 주의

1. 사용할 때마다 충분히 흔들어서 사용하십시오.
2. 사용 전에 백신을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
3. 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
4. 주사방법이 잘못되면 동통, 경결 및 화농이 생길 수 있습니다.
5. 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 주사 부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.
6. 주사 시 주사통증에 의해 접종자가 동물의 공격을 받을 수 있으므로 안전사고에 주의하십시오.
7. 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

바. 저장상의 주의사항

1. 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.
2. 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
3. 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
4. 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
5. 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

## ■포장단위

- 1두분, 3두분, 5두분, 10두분

**KBNP 고려비엔피**

충남 예산군 신암면 추사로 235-9  
 영업부:(031)478-5560(대표)  
 www.kbnp.co.kr

