

마크로틸 액(Macrolil solution)은 마크로라이드계열 반합성 항균물질인 틸미코신 단일 제제로 틸미코신은 병원성 미생물에 대한 주요 방어기전인 탐식작용 역할을 하는 탐식세포조직 내로 약효가 신속히 분포 및 축적되어 탐식세포와 함께 감염부위로 신속히 이동, 항균작용을 하는 특징을 가지고 있기 때문에 양계, 양돈 호흡기 질병에 매우 효과적인 제품입니다.

#### ■원료약품 및 분량 (본제 1L 중)

- 틸미코신인산염 (Tilmicosin Phosphate, 별규) 150g(역가)

#### ■효능 및 효과

틸미코신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

가. 닦

- 마이코플라즈마병 (*Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*)

나. 돼지

- 파스튜렐라 페렴 (*Pasteurella multocida*)
- 흉막페렴 (*Actinobacillus pleuropneumoniae*)
- 마이코플라즈마성 페렴 (*Mycoplasma hyopneumoniae*)

#### ■용법 및 용량

가. 닦

일일 음수 L당 본제 0.5mL(틸미코신으로서 75mg)을 희석하여 3~5일간 음수투여

나. 돼지

일일 음수 L당 본제 1.33mL(틸미코신으로서 200 mg)을 희석하여 5일간 음수투여

#### ■저장방법 및 유효기간

- 가. 저장방법 : 실온(1~30℃)에 암소에 보관
- 나. 용기종류 : 기밀용기
- 다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월



동물용의약품
처방대상동물용의약품
휴약기간준수

# 마크로틸 액

강력 호흡기 컨트롤

1L



#### ■주의사항

- 가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것  
본제 및 Macrolide계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- 나. 상호작용  
Lincosamide계 및 다른 Macrolide계의 항생제와 병용하지 마십시오.
- 다. 임신, 수유축, 신생축, 어린 가축, 쇠약축 등에 대한 투여  
1. 임신 중인 돼지와 번식목적의 돼지에는 사용하지 마십시오.  
2. 산란 중인 닭에는 사용하지 마십시오.
- 라. 적용상의 주의  
음수에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 악화사고를 초래하거나 투여목적을 달성할 수 없으므로 잘 혼합하여 사용하십시오.
- 마. 휴약기간  
• 닦 : 10일 • 돼지 : 7일
- 바. 저장상의 주의사항  
1. 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.  
2. 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.  
3. 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.  
4. 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.  
5. 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.



HDPE

리밸: PP

4024065

130902

**KBNP 고려비엔피**

충남 예산군 신암면 추사로 235-9 영업부:(031)478-5560(대표)