

# 힘백 소 아까바네 생독백신

본 백신은 조직배양순화 소 아까바네 바이러스를 배양세포에 접종 증식시켜 그 배양액에 보호제를 가하여 유제한 뒤 진공동결 건조한 생독백신입니다.

## ■원료약품 및 분량 (본제 1두분 중)

- 1) 소 아까바네 생독백신
  - 아까바네 바이러스(BY-JH-20주)  
조직배양세포 감염배양액  
( $10^{6.5}$ TCID<sub>50</sub>/mL이상) - - - - - 50%
  - SPGA 보호제 (부기 1) - - - - - 50%
- 2) 희석액
  - Gelatin - - - - - 0.5%
  - PBS (부기 2) - - - - - 잔량

## ■성 상

- 생물학적제제, 대항백색의 건조괴이며 이물 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이 균일하여야 한다.

## ■효능 및 효과

- 이 백신은 소의 아까바네 바이러스에 의한 소의 이성산의 예방목적으로 소에 사용 하십시오.

## ■용법 및 용량

- 소 아까바네 생독백신은 반드시 소 아까바네 생독백신 희석액으로 용해하여 야 하며 용해 후 10분 이내에 경부 피하에 1mL씩 접종하고 보강접종은 매년 모기 발생 이전에 1회 접종하십시오.

## ■포장단위

- 1두분, 3두분, 6두분, 15두분, 30두분.

## ■저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 2~8℃의 냉장소에 보관
- 용기종류 : 밀봉용기
- 유효기간 : 제조일로부터 24개월간

## ■주의사항

- 1) 반드시 수의사의 지시에 따라 사용 하십시오.
- 2) 소의 건강상태를 확인하고, 건강한 소에 접종 하십시오.
- 3) 질병감염이 의심되거나 장거리 수송등 심한 스트레스를 받았을 때는 접종을 삼가하십시오.
- 4) 본 백신을 희석액으로 용해한 후 얼음물에 넣었을 때는 4시간, 실온에서는 2시간 이내에 사용하십시오.
- 5) 본 백신은 반드시 첨부된 희석액으로 사용하십시오.
- 6) 본 백신은 직사광선이나 고온에 노출 되지 않도록 주의하십시오.
- 7) 본 백신은 생독백신이므로 주사기구 및 고무마개를 알콜 등 소독약품으로 소독하지 마십시오.
- 8) 반드시 1두 1침을 사용하십시오.
- 9) 일단 개봉한 백신은 전량 사용하며 잔량이나 빈병은 소각처분 하십시오.



충남 예산군 신암면 추사로 235-9  
 영업부:(031)478-5560(대표)  
 www.kbnp.co.kr

