

힘백 소 유행열 생독백신

■ 원료약품 및 분량

- 1) 소 유행열 생독백신[본제 1두분 중]
- 소 유행열 약독 바이러스 (B23-M11-H5주) ----- 10^{3.0}TCID₅₀이상
 - TPGG 보호제 [부기 1] ----- 20%
- 2) 희석액
- Gelatin ----- 0.5%
 - PBS [부기 2] ----- 잔 량

■ 제형 및 성상

- 생물학적제제, 대황백색의 건조괴이며
이물 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이
균일하여야 합니다.

■ 효능 및 효과

- 소 유행열 바이러스의 감염을 예방 목적으로
소에 사용하십시오.

■ 용법 및 용량

- 소 유행열 생독백신에 동봉한 희석액으로
용해하여 10분 이내에 경부 피하접종
하십시오.
- 기초접종 : 품종, 체중에 관계없이 6개월령
이상의 소에 접종하며, 모기발생 이전에
3~4주 간격으로 2.0mL씩 2회 접종 하십시오.
- 보강접종 : 기초접종이 끝난 소는 매년
모기발생 이전에 1회 접종 하십시오.

■ 포장단위

- 2두분, 3두분, 5두분, 10두분, 20두분.

■ 저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 2~8°C의 냉암소에 보관, 밀봉용기
- 유효기간 : 제조일로부터 24개월간

■ 주의사항

- 1) 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 2) 소의 건강상태를 확인하고, 건강한 소에
접종하십시오.
- 3) 질병감염이 의심되거나 장거리 수송등 심한
스트레스를 받았을 때는 접종을 삼가
하십시오.
- 4) 본 백신은 희석액으로 용해한 후 얼음물에
넣었을 때는 4시간, 실온에서는 2시간 이내에
사용하십시오.
- 5) 본 백신은 반드시 첨부된 희석액으로 사용
하십시오.
- 6) 본 백신은 직사광선이나 고온에 노출되지
않도록 주의하십시오.
- 7) 본 백신은 생독백신이므로 주사기구 및
고무마개를 알콜등 소독약품으로 소독하지
마십시오.
- 8) 반드시 1두 1침을 사용 하십시오.
- 9) 일단 개봉한 백신은 전량 사용하며 잔량이나
빈병은 소각처분 하십시오.

