



### 일반적인 유의사항

- ✓ 백신은 2~8℃ 의 냉암소에 보관하십시오.  
특히 생백신은 열에 노출되지 않도록 하고 오일백신은 얼지 않도록 하십시오.
- ✓ 사용 전 유효기간을 꼭 확인하십시오.
- ✓ 접종방법과 사용량을 정확히 확인하십시오.
- ✓ 반드시 건강한 동물에만 접종하십시오.
- ✓ 백신을 사용 후에는 잔여량과 빈병 등은 소각, 매립하십시오.

### 예방접종에 따른 유의사항

#### 1. 음수접종법

- ✓ 물은 깨끗하고 중성이어야 하며, 소독제, 세제, 염소, 철, 구리, 아연 등이 들어있지 않아야 합니다.
- ✓ 급수기는 지하수로 깨끗이 청소하십시오.
- ✓ 음수량을 정확히 계산하고, 급수기를 충분히 준비하여 전체가 동시에 충분한 양을 먹도록 하십시오.
- ✓ 일정시간 단수를 하였다가 해뜨기 전에 투여하여 1~2시간 내에 모두 먹도록 하십시오.
- ✓ 햇빛과 열을 피하고, 보호제로서 탈지분유를 0.3~0.5% 첨가하면 더욱 효과적입니다.

#### 2. 비강접종법, 점안접종법

- ✓ 지정된 희석액을 사용하십시오.
- ✓ 접종부위에 정확하게 접종하십시오.
- ✓ 빠른 시간 내에 접종하여 손의 체온에 의한 영향이 없도록 하십시오.

#### 3. 분무법

- ✓ 입자의 크기가 너무 작지 않도록 하십시오.
- ✓ 정확한 양의 희석액을 사용 하십시오.

#### 4. 천자법

- ✓ 침에 묻는 지방성분을 자주 닦아주어야 합니다.

#### 5. 주사법

- ✓ 생백신의 경우 주사기, 주사바늘, 백신병 등을 알코올 등 소독약품으로 소독하지 마십시오.
- ✓ 지시된 접종 부위에 접종하십시오.
- ✓ 피하지방 조직 내에 주사하지 않도록 주의하십시오.

- ✓ 근육주사를 할 때에는 흉부 근육 내에 주사하십시오.
- ✓ 경부피하주사를 할 때에는 바늘 끝이 몸통 쪽으로 향하게 합니다.
- ✓ 오일백신은 사용 직전과 사용 중에도 잘 흔들어서 균질한 상태에서 사용하십시오.

#### 예방접종 프로그램 작성시 고려사항

- ✓ 농장에서 문제되는 질병
- ✓ 모체이행항체수준
- ✓ 백신간의 간섭현상: ND와 IB, ND와 ILT는 1~2주 정도의 간격을 두어 접종하십시오.